

Aptima-kontrolkit

Til *in vitro* diagnostisk brug

Tilsigtet brug

Aptima kontrolkit er kun beregnet til anvendelse sammen med Aptima-analyser til detektion af *C. trachomatis* og/eller *N. gonorrhoeae*. Disse kvalitetskontrolreagenser skal anvendes i henhold til anvisningerne i indlægssedlen for den relevante Aptima-analyse for at etablere kørselsvaliditet.

Reagenser

Bemærk: For oplysninger om enhver fare og sikkerhedserklæringer, der kan være tilknyttet reagenser, henvises til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdataark) på www.hologic.com/sds.

Materialer, der følger med

Aptima kontrolkit (Kat. Nr. 301110)

Symbol	Komponent	Kvantitet	Beskrivelse
PCT/NGC	Aptima positiv kontrol, CT/ negativ kontrol, GC	5 x 1,7 ml	<i>Ikke-infektiøs CT-nukleinsyre i en bufferopløsning, der indeholder < 5 % opvaskemiddel. Hver prøve på 400 µl indeholder anslæt rRNA tilsvarende 1 CT-cell (CT IFU) (5 fg/analyse*)</i> .
PGC/NCT	Aptima positiv kontrol, GC/ negativ kontrol, CT	5 x 1,7 ml	<i>Ikke-infektiøs GC-nukleinsyre i en bufferopløsning, der indeholder < 5 % opvaskemiddel. Hver prøve på 400 µl indeholder anslæt rRNA tilsvarende 50 GC-cell (250 fg/analyse*)</i> .

* rRNA-ækvivalenserne er beregnet på grundlag af genom-størrelse og anslæt DNA-RNA-forhold pr. celle i organismen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Til anvendelse med Aptima-analyser til detektion af *C. trachomatis* og/eller *N. gonorrhoeae*. Den positive kontrol, CT (negative kontrol, GC) fungerer som negativ kontrol af GC-analyser/testresultater. Den positive kontrol, GC (negative kontrol, CT) fungerer som negativ kontrol af CT-analyser/testresultater.

Krav til opbevaring og håndtering

Reagenserne i Aptima-kontrolkittene skal opbevares ved 2-8 °C og er holdbare indtil datoens angivet på hætteglassene.

Ved opvarmning til stuetemperatur kan visse kontrolreagensglas blive uklare eller få bundfalde. Uklarhed eller bundfalde i forbindelse med kontroller indvirker ikke på kontrolpræstationen. Kontrollerne kan anvendes, hvad enten de er klare eller uklare/har bundfalde. Hvis der ønskes klare kontroller, kan solubilisering fremskyndes ved at inkubere dem i den øvre ende af stuetemperaturområdet (15-30 °C).

Aptima-analyseprocedure

Se afsnittet om testproceduren på indlægssedlen til Aptima eller instrumentets brugervejledning for anvisninger om proceduren.

Aptima-analysens forventede resultater

Kontrol	CT-resultat*	GC-resultat*
Positiv kontrol, CT/negativ kontrol, GC	Positivt	Negativ
Positiv kontrol, GC/negativ kontrol, CT	Negativ	Positivt

*Se Aptima-analysens indlægsseddel for specifikke RLU-værdier forbundet med Aptima-kontrollerne.

Skulle resultaterne falde uden for disse forventede resultater, kontaktes teknisk rådgivning hos Hologic for assistance.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundesupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)

customersupport@hologic.com

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

For yderligere kontaktoplysninger henvises til www.hologic.com.

©2003-2017 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

IN0114-01DA Rev. 002

2017-04